UKURAN LINGKAR PERGELANGAN TANGAN SEBAGAI INDIKATOR KEGEMUKAN PADA ANAK USIA SEKOLAH DASAR DI KOTA BOGOR JAWA BARAT

Hermina¹ dan Abas Basuni Jahari¹

¹Puslitbang Gizi dan Makanan Depkes RI Bogor

ABSTRACT

WRIST CIRCUMFERENCE AS AN INDICATOR FOR OBESITY AMONG PRIMARY SCHOOL CHILDREN IN BOGOR, WEST JAVA

Introduction: Obesity is now increasing problem among primary school children. Obesity during childhood has a consequence of obesity in the teen age. Approximately, one third of children with obesity will become obese in their older age.

Objective: To examine the reliability of wrist circumference as an indicator of obesity, particularly for rapid assessment.

Method: The analysis used data from the study on "The development of nutrition education intervention for primary school children from middle economic class families (2001)". The sample in this study is primary school children age 9-12 years from several favorite schools in the city of Bogor West Java. The weight and height of 1990 children were collected during the study. In addition data of wrist circumference was collected by a simple method non numerical measure but a qualitative. The method used was by connecting the thumb and the mid-finger of child's right hand on the wrist of child's left hand. The method gives three condition: 1) Normal if the tips of thumb and mid-finger touch each other and no space between wrist and the circle made by the thumb and mid-finger, 2) Thin if the tips of thumb and mid-finger touch each other but there is space between the wrist and the circle, and 3) overweight/obese if the tips thumb and mid-finger does not touch each other. Data on weight and height were converted into z-score weight-for-height (Z-WH) based on WHO-NCHS standard, 1982. Kappa coefficient was obtained to evaluate the reliability of wrist circumference to Z-WH in identifying obesity among school children.

Result: 76% of overweight/obese children and 95% of non-overweight/obese children could be identified by using wrist circumference. The Kappa coefficient for the reliability test is 0,6 and is a sufficiently reliable.

Conclusion: Wrist circumference could be used as a simple tool for a rapid assessment or screening of obesity among school children.

Keywords: obesity, wrist circumference, weight-for-height Z-score, school children

PENDAHULUAN

Dari tahun ke tahun, masalah 'gizi lebih' atau kegemukan (*overweight dan obesitas*) di Indonesia ada kecenderungan meningkat secara konsisten dengan segala risikonya. Hasil dari beberapa penelitian mengungkapkan bahwa masalah kegemukan ini sudah dialami oleh kelompok penduduk berusia muda. Data Survei

Kesehatan Rumah Tangga tahun 2004 (SKRT 2004) menunjukkan bahwa prevalensi gizi-lebih pada kelompok anak usia 5-12 tahun sebesar 8,5 persen (Balitbangkes, tahun 2005)⁽¹⁾. Dari kegiatan survei anemia gizi pada anak sekolah dasar di lima wilayah DKI Jakarta tahun 2004 ditemukan sebesar 11,1 persen berstatus gizi lebih, dan ditemukan lebih banyak pada anak laki-laki (11,6%) dibandingkan anak perempuan (10,5%)⁽²⁾.

Hasil penelitian sebelumnya ditemukan bahwa masalah kegemukan pada anak sekolah lebih banyak ditemukan di sekolah favorit dibandingkan dengan sekolah tidak favorit^(3,8). Hasil penelitian Hermina dkk. (tahun 2001) yang dilakukan terhadap anak usia sekolah dasar di SD favorit di Kota Bandung menemukan prevalensi gizi lebih sebesar 16,0 persen⁽³⁾. Penelitian status gizi anak-anak yang dilakukan Wiramiharja, dkk. di kota yang sama pada tahun 1993 menyebutkan bahwa 12 persen anak SD usia di atas 10 tahun dari berbagai tingkat sosial ekonomi ditemukan telah mengalami kegemukan⁽⁴⁾. Tampak bahwa dalam kurun waktu lebih dari lima tahun di kota yang sama prevalensi kegemukan pada anak sekolah cenderung meningkat. Demikian pula di Amerika Serikat, masalah obesitas dalam kurun waktu lima tahun (1996-2001) cenderung terus meningkat prevalensinya pada usia remaja hingga dewasa muda⁽⁵⁾. Kondisi seperti itu tentunya ada kaitannya dengan masalah gizi pada masa kanak-kanak dan masa pra-remaja.

Masalah kegemukan pada anak usia sekolah dasar, saat ini perlu mendapat perhatian yang serius. Menurut WHO tahun 2000, penelitian di negara maju menyebutkan bahwa kejadian kegemukan pada orang dewasa, berawal sejak masa kanak-kanak yakni 36 persen berawal sejak umur 3-6 tahun dan 55 persen berawal sejak umur 6-10 tahun^(6,11).

Kegemukan sering dihubungkan dengan proporsi tubuh individu yakni indeks massa tubuh (IMT) atau ukuran antropometri dengan menggunakan kriteria berat badan (BB) dan tinggi badan (TB) atau disingkat BB/TB menurut anjuran WHO-NCHS⁽⁹⁾.

Selain berat badan dan tinggi badan, saat ini kegemukan dapat diidentifikasi dari ukuran tubuh lainnya seperti lingkaran perut, lingkaran pinggul, lingkaran pinggang atau lingkaran ikat pinggang dan yang lainnya terutama pada orang dewasa. Ukuran tubuh tersebut memerlukan alat dan standar yang belum tentu dapat digunakan oleh setiap individu. Oleh karena itu dikembangkan cara sederhana untuk deteksi masalah kegemukan pada anak yaitu ukuran lingkaran

pergelangan tangan (ULPT) yang dapat diukur oleh anak itu sendiri.

Ukuran lingkaran pergelangan tangan anak diduga dapat dijadikan salah satu cara termudah dan termurah untuk mengetahui kegemukan pada anak sekolah. Pada makalah ini disajikan analisis hasil pengukuran lingkaran pergelangan tangan anak kaitannya dengan kegemukan yang diukur menggunakan alat antropometri menurut indeks berat badan dan tinggi badan (BB/TB) pada anak usia sekolah dasar.

BAHAN DAN CARA

Analisis atau kajian ini didasarkan pada data anak sekolah dasar (SD) yang dikumpulkan dalam penelitian "Pengembangan intervensi pendidikan gizi untuk anak usia sekolah dasar pada keluarga menengah di perkotaan".

Penelitian tersebut dilakukan pada tahun 2001 di Kota Bogor, Jawa Barat dengan mengambil sampel murid SD kelas 5 dan 6 (usia 9-12 tahun) di sekolah dasar yang dianggap favorit ($n=1990$)⁽⁷⁾.

Sembilan SD favorit yang diteliti adalah: SD-RP, SDN-P4, SDN-P1, SDN-S2, SDN-B3, SD-P, SDN-BT2, SD-TH dan SD-BI, yang berlokasi di lima kecamatan di Kota Bogor yakni kecamatan Bogor Barat, Bogor Selatan, Bogor Timur, Bogor Tengah dan Tanah Sereal.

Di antara data yang dikumpulkan dalam penelitian tersebut, data yang digunakan untuk analisis ini adalah berat badan (BB), tinggi badan (TB), tanggal lahir, tanggal diukur TB dan ditimbang BB, jenis kelamin dan lingkaran pergelangan tangan kiri anak. Berat badan ditimbang dengan timbangan digital 'Seca' dengan ketelitian 0,1 kg. Sedangkan tinggi badan diukur menggunakan microtoice dengan ketelitian 0,1 cm. Umur anak dihitung berdasarkan tanggal lahir dan tanggal pengukuran. Ukuran lingkaran pergelangan tangan anak diukur dengan melingkarkan ibu jari dan jari tengah tangan kanan, ke pergelangan tangan kiri yang dilakukan oleh murid yang

bersangkutan dengan pengamatan tim peneliti.

Hasil pengukuran pergelangan tangan anak dinilai secara kualitatif dengan skala ordinal 1 sampai 3. Masing-masing kategori adalah sebagai berikut:

1. Kategori 1: Normal, jika ibu-jari dan jari-tengah dilingkarkan pada pergelangan tangan kiri dapat bersentuhan satu sama lain. Atau tidak ada jarak antara pergelangan tangan dengan lingkaran yang dibuat oleh ibu-jari dan jari-tengah (pas/tidak-longgar).
2. Kategori 2: Kurus, jika ibu-jari dan jari-tengah dilingkarkan pada pergelangan tangan kiri dapat bersentuhan satu sama lain, tapi ada jarak antara pergelangan tangan dengan lingkaran yang dibuat oleh ibu-jari dan jari-tengah (longgar).
3. Kategori 3: Overweight/obes, jika ibu-jari dan jari-tengah dilingkarkan pada pergelangan tangan kiri tidak dapat bersentuhan satu sama lain (renggang).

Data berat dan tinggi badan dikonversikan menjadi nilai Z-Score menurut baku WHO-NCHS. Nilai Z-Score ini kemudian digunakan untuk menilai status kegemukan anak, yaitu:

1. Kurus; bila nilai Z-Score < -2 SD
2. Normal; bila nilai Z-Score ≥ -2 SD dan ≤ 2 SD
3. Risiko gemuk (overweight); bila nilai Z-Score > 2 SD dan ≤ 3 SD

4. Berat badan lebih (gemuk/obes); bila nilai Z-Score > 3 SD

Untuk mengukur hubungan antara variabel independen (ukuran lingkaran pergelangan tangan) dengan variabel dependen (status kegemukan pada anak) dilakukan analisis bivariat dengan menggunakan uji statistik *Pearson Chi square*. Sedangkan untuk menguji reliabilitas pengukuran pergelangan tangan murid dengan pengukuran status kegemukan dilakukan uji *measure of agreement Kappa*.

HASIL DAN BAHASAN

Keadaan Gizi Murid

Secara keseluruhan murid SD yang diteliti berumur antara 9-12 tahun. Jumlah murid laki-laki dan perempuan berimbang. Keadaan gizi murid di sembilan SD favorit yang diteliti sebagian besar adalah normal (89,6%) menurut Z-Score BB/TB. Sebanyak 2,7 persen kurus dan 7,7 persen berstatus gizi lebih (5,0% beresiko gemuk/overweight dan 2,7% gemuk/obes).

Murid laki-laki lebih banyak yang beresiko gemuk (8,1%) dibanding murid perempuan (2,0%), demikian pula lebih banyak murid laki-laki yang gemuk (4,9%) dibanding murid perempuan (0,5%), disajikan pada Tabel 1. Nilai Z-Score indeks BB/TB, rata-rata adalah $0,09 \pm 1,26$ dengan rentang nilai terendah -3,1 dan nilai tertinggi 7,0 standar deviasi Z-Score BB/TB.

Tabel 1
Distribusi Murid Berdasarkan Jenis Kelamin dan Status Gizi dengan Indeks Berat Badan menurut Tinggi Badan (BB/TB)

Jenis kelamin	Status gizi menurut indeks BB/TB									
	Kurus		Normal		Resiko gemuk		Gemuk		Jumlah	
	n	%	n	%	n	%	n	%	n	%
Laki-laki	28	2,9	823	84,2	79	8,1	48	4,9	978	100
Perempuan	26	2,6	961	95,0	20	2,0	5	0,5	1012	100
Jumlah	54	2,7	1784	89,6	99	5,0	53	2,7	1990	100

Tabel 2 menunjukkan bahwa kejadian kegemukan pada murid SD usia 9-12 tahun lebih banyak diderita oleh murid laki-laki

(13,0%) dibanding murid perempuan (2,5%). Dari Tabel 2 terlihat bahwa jenis kelamin sangat berkaitan dengan kegemukan pada

murid SD usia 9-12 tahun ($p < 0,001$). Murid laki-laki mempunyai risiko 6 kali menderita kegemukan dibanding murid perempuan ($OR=5,89$; $95\%CI=3,80 - 9,14$; $p=0,000$). Kondisi seperti ini sama dengan yang diungkapkan dalam survey anemia gizi pada

anak usia sekolah dasar di DKI Jakarta (2004), yang menemukan bahwa murid yang berstatus gizi lebih, banyak ditemukan pada murid laki-laki dibanding murid perempuan (2).

Tabel 2
Distribusi Murid Berdasarkan Jenis Kelamin dan Status Gizi dengan Indeks Berat Badan menurut Tinggi Badan (BB/TB)

Jenis kelamin	Status Kegemukan				Jumlah	
	Gemuk		Tidak Gemuk			
	n	%	n	%	n	%
Laki-laki	127	13,0	851	87,0	978	100
Perempuan	25	2,5	987	97,5	1012	100
Jumlah	152	7,6	1838	92,4	1990	100

$\chi^2 = 77,952$ $df=1$ $p=0,000$ $OR: 5,89$ $95\%CI: 3,80 - 9,14$; $p=0,000$

Hubungan Pergelangan Tangan dengan Status Kegemukan

Tabel 3 menunjukkan bahwa pada kondisi gizi murid risiko gemuk dan gemuk, maka pergelangan tangannya cenderung besar. Bila pergelangan tangan kiri murid-murid tersebut diukur dengan lingkaran ibu-jari dan jari-tengah tangan kanannya sendiri, maka lingkaran jari-jari tersebut akan renggang. Sebagian besar murid yang ukuran lingkaran pergelangan tangannya

(ULPT) renggang, termasuk dalam kategori status gizi 'gemuk' menurut indeks BB/TB. Sementara itu bila ULPT murid yang tidak renggang (longgar atau pas) termasuk kategori status gizi normal dan kurus (menurut indeks BB/TB). Dari Tabel 3 tersebut tampak bahwa hasil pengukuran ULPT sangat berhubungan dengan hasil pengukuran BB/TB menurut indeks BB/TB ($p < 0,001$).

Tabel 3
Distribusi Status Gizi Murid menurut Indeks BB/TB dan Ukuran Lingkaran Pergelangan Tangan (ULPT)

Status gizi menurut ULPT*	Status gizi menurut indeks BB/TB**									
	Kurus		Normal		Risiko gemuk		Gemuk		Total	
	n	%	n	%	n	%	n	%	n	%
Kurus	53	3,6	1395	95,8	8	0,5	0	0	1456	100
Normal	1	0,3	291	90,9	26	8,1	2	0,6	320	100
Gemuk	0	0	98	45,8	65	30,4	51	23,8	214	100
Jumlah	54	2,7	1784	89,6	99	5,0	53	2,7	1990	100

$\chi^2 = 532,119$ $df = 6$ $p = 0,000$ *) ULPT=ukuran lingkaran pergelangan tangan

Pada Tabel 4 terdapat hubungan antara status kegemukan dengan ukuran pergelangan tangan anak ($p < 0,001$). Dari tabel tersebut murid yang gemuk menurut Z-Score BB/TB sebanyak 76,3% ($n=116$) dapat

teridentifikasi oleh pergelangan tangannya. Demikian juga murid yang tidak gemuk menurut Z-Score BB/TB sebanyak 94,7% ($n=1740$) teridentifikasi oleh pergelangan tangannya.

Tabel 4 menunjukkan pula bahwa murid-murid yang gemuk (berisiko gemuk dan gemuk) mempunyai risiko 57 kali lebih besar pergelangan tangannya dibanding dengan murid yang tidak gemuk ($OR=57,2$; 95% $CI=37,4 - 87,6$; $p=0,000$).

Sebaliknya bila murid itu 'tidak gemuk' menurut Z-Score BB/TB (kurus dan normal), maka ukuran lingkari pergelangan tangannya relatif kecil/sedang, dan ukuran lingkari jari tangan kanan di pergelangan tangan kirinya

'tidak renggang' atau ujung jari tersebut saling bersentuhan (longgar atau pas). Bila ULPT 'tidak renggang' maka status gizi menurut ULPT adalah 'tidak gemuk'.

Dalam Tabel 4 tersebut tampak pula bahwa koefisien *Kappa* sebagai derajat reliabilitas antara kedua indikator yakni status gizi menurut ULPT dan menurut Z-Score BB/TB adalah cukup kuat dan cukup *reliable* ($Kappa=0,598$ std. E.=0,031 $p=0,000$).

Tabel 4
Hubungan Antara Status Kegemukan menurut Z-Score BB/TB dan Ukuran Lingkari Pergelangan Tangan (ULPT) pada Murid Usia 9-12 Tahun

Status Kegemukan menurut Ukuran Lingkari Pergelangan Tangan	Status Kegemukan menurut Z-Score BB/TB				Jumlah	
	Gemuk		Tidak Gemuk			
	n	%	n	%	n	%
Gemuk (ULPT renggang)	116	76,3	98	5,3	214	100
Tidak Gemuk (ULPT tdk renggang)	36	23,7	1740	94,7	1776	100
Jumlah	152	7,6	1838	92,4	1990	100

$X^2 = 729,686$ $df=1$ $p=0,000$; $Kappa=0,598$ std. E. = 0,031 $p=0,000$
 $OR: 57,2$ 95% $CI: 37,4 - 87,6$ $p=0,000$

Pada Tabel 4 dapat dilihat lebih jelas bahwa sebanyak 76,3% murid yang gemuk menurut Z-Score BB/TB mempunyai ukuran lingkari pergelangan tangan (ULPT) yang renggang. Sementara itu 94,7% murid yang tidak gemuk ULPTnya tidak renggang.

KESIMPULAN

Kesimpulan

Ukuran lingkari pergelangan tangan (ULPT) murid sangat berkaitan dengan kegemukan. Murid yang berstatus gizi lebih atau gemuk (risiko gemuk dan gemuk), ukuran lingkari pergelangan tangannya lebih besar dibanding dengan murid yang tidak gemuk.

Sebanyak 76,3% murid yang gemuk dan 94,7% murid yang tidak gemuk menurut Z-Score BB/TB dapat teridentifikasi oleh pergelangan tangannya. Koefisien '*Kappa*' sebagai ukuran derajat reliabilitas antara

kedua indikator kegemukan (menurut Z-Score BB/TB dan ULPT) cukup kuat dan *reliable* sebagai indikator pengukuran status kegemukan ($kappa=0,598$).

Dari hasil analisis ini dapat disimpulkan bahwa ukuran lingkari pergelangan tangan (ULPT) kiri seorang anak yang diukur dengan lingkaran antara ujung ibu-jari dan jari-tengah tangan kanan anak yang bersangkutan, dapat digunakan sebagai alat atau indikator untuk penapisan kegemukan pada anak sekolah. Bila ukuran lingkari pergelangan tangan (ULPT) anak 'gemuk' atau masuk dalam kategori 3 (ULPT renggang) maka anak tersebut termasuk gemuk dan perlu dikonfirmasi lebih lanjut dengan pemeriksaan antropometri dan kesehatannya).

Saran

Hasil penelitian ini perlu dikaji lebih lanjut dengan melakukan uji-coba

pengukuran lingkaran pergelangan tangan (ULPT) pada populasi di tempat yang berbeda dengan cakupan yang lebih besar, agar ULPT pada anak usia sekolah dapat digunakan sebagai salah satu cara termudah dan termurah untuk mengidentifikasi kegemukan pada anak sekolah.

RUJUKAN

1. Badan Litbang Kesehatan Dep.Kes. RI. Survei Kesehatan Rumah Tangga tahun 2004 (SKRT 2004). Volume 2, 2005.
2. Dinkes Provinsi DKI Jakarta dan Puslitbang gizi & makanan. Survei Anemia Gizi pada Anak Sekolah Dasar di DKI Jakarta tahun 2004. Jakarta, 2004.
3. Hermina, Nurfi Afriansyah, Trintrin T. Mudjianto, Tjetjep S. Hidayat dan Abas B. Jahari. Pengembangan Materi Pesan-Pesan Gizi untuk Pencegahan dan Penanggulangan Masalah Kegemukan pada Usia Dini. Pusat Penelitian dan Pengembangan Gizi dan Makanan, 2001. Laporan Penelitian.
4. Wiramiharja, K.K. Kondisi gizi anak sekolah dasar umur 10-13 tahun di Kodya Bandung. MKB 1993,25.
5. Penny Gordon-Larsen, al. all. Five-Year Obesity incidence in the Transition Period between Adolescence and Adulthood: The National Longitudinal Study of Adolescence Health. Am. Journal Clinical Nutrition, 2004;80:569-575.
6. Inoue, S. and Zimmet, P. at all. The Asia-Pacific perspective: Redefining Obesity and its Treatment. IASO. WHO. February 2000.
7. Hermina, Nurfi Afriansyah, Tjetjep S. Hidayat, Trintrin T. Mudjianto dan Abas B. Jahari. Pengembangan intervensi pendidikan gizi untuk anak usia sekolah dasar pada keluarga menengah di perkotaan. Badan Penelitian dan Pengembangan Kesehatan Dep Kes RI., 2002. Laporan Penelitian Risbinkes.
8. Irawati, A., dkk., Status Gizi Murid Taman Kanak-Kanak dan Sekolah Dasar di Sekolah Favorit dan Bukan Favorit. Penelitian Gizi dan Makanan. 1992. 14:25-34.
9. WHO. Measuring Change in Nutritional Status. Geneva: WHO, 1983.
10. Lohman G. Timothy, Alex F. Roche dan Reynaldo Martorell. Antropometric standardization reference manual. Champaign, Illinois. Human Kinetics Books. s.a.
11. Whitaker et al. Tracking BMI-for-age birth to 18 years with percent of overweight children who are obese at age 25. NEJM: 1997;337:869-873.